

# Θεωρία Γραφημάτων

## 8η Διάλεξη

A. Συμβόνης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών  
Τομέας Μαθηματικών

Φεβρουάριος 2017

# Χρωματισμοί γραφημάτων

## Χρωματισμός κορυφών

### ***k*-χρωματισμός:**

Έστω γράφημα  $G$ . Η συνάρτηση  $\chi : V(G) \rightarrow [1, \dots, k]$  ονομάζεται ***k*-χρωματισμός** του  $G$  αν για κάθε ακμή  $e = (u, v) \in E(G)$  ισχύει ότι  $\chi(u) \neq \chi(v)$ .


### **Χρωματικές κλάσεις:**

Έστω ένα γράφημα  $G$  και έστω  $\chi$  ένας  $k$ -χρωματισμός του. Τα σύνολα κορυφών  $\chi^{-1}(1)$ ,  $\chi^{-1}(2)$ , ...,  $\chi^{-1}(k)$  ονομάζονται **χρωματικές κλάσεις** του  $G$ .


### **Χρωματικός αριθμός:**

Έστω ένα γράφημα  $G$ . Ο **χρωματικός αριθμός**  $\chi(G)$  του γραφήματος  $G$  είναι ο μικρότερος ακέραιος  $k$  για τον οποίο ισχύει ότι το  $G$  είναι  $k$ -χρωματίσιμο.

Παραδείγματα:




$$\chi(G_1) = 2$$




$$\chi(G_3) = 5$$

$$\chi(K_n) = n$$



$$\chi(G_2) = 4$$



$$\chi(G_4) = 3$$

Το  $G_4$  είναι ένα τριμερές γράφημα.

### Λήμμα 8.1:

Έστω γράφημα  $G$  το οποίο έχει ως επαγόμενο υπογράφημά του το πλήρες γράφημα  $K_k$  κορυφών  $K_k$ . Τότε  $\chi(G) \geq k$ .

### Απόδειξη :

- Έστω ότι υπάρχει σύνολο  $S \subseteq V(G)$  με  $|S| = k$  και το υπογράφημα  $H$  του  $G$  το οποίο επάγεται από τις κορυφές του  $S$  είναι πλήρες.
- Έστω ότι υπάρχει ένας  $\ell$ -χρωματισμός του  $G$ ,  $\ell < k$ .
- Τότε, τουλάχιστον δύο κορυφές του  $H$  έχουν το ίδιο χρώμα.
- Λόγω του ότι το  $H$  είναι πλήρες γράφημα, οι κορυφές αυτές ενώνονται με ακμή.
- Άρα, ο  $\ell$ -χρωματισμός του  $G$  δεν είναι “νόμιμος”. **Άτοπο.** ■

## Πλήρες $k$ -μερές:

Το γράφημα  $K_{p_1, p_2, \dots, p_k} = \overline{K_{p_1} \cup K_{p_2} \cup \dots \cup K_{p_k}}$ ,  $k \geq 2$ , όπου  $p_1, p_2, \dots, p_k$  ακέραιοι, ονομάζεται **πλήρες  $k$ -μερές γράφημα**.

- Τα σύνολα κορυφών  $V(K_{p_1}), \dots, V(K_{p_k})$  είναι τα **μέρη** του  $K_{p_1, p_2, \dots, p_k}$ .

## $k$ -μερές γράφημα:

Ένα παραγόμενο υπογράφημα ενός πλήρους  $k$ -μερούς γραφήματος.

## Λήμμα 8.2:

Έστω το γράφημα  $K_{p_1, p_2, \dots, p_k}$ . Τότε ισχύει:

i.  $|V(K_{p_1, p_2, \dots, p_k})| = p_1 + p_2 + \dots + p_k [= n]$

ii.  $|E(K_{p_1, p_2, \dots, p_k})| = \frac{1}{2}(n^2 - \sum_{i=1}^k p_i^2)$

## Απόδειξη :

ii.  $E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k p_i(n - p_i) = \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^k p_i n - \sum_{i=1}^k p_i^2 \right) = \frac{1}{2} \left( n \sum_{i=1}^k p_i - \sum_{i=1}^k p_i^2 \right) = \frac{1}{2} \left( n^2 - \sum_{i=1}^k p_i^2 \right)$



### Λήμμα 8.3:

Έστω γράφημα  $G$ . Το  $G$  είναι  $k$ -χρωματίσιμο αν και μόνο αν το  $G$  είναι  $k$ -μερές.

#### Απόδειξη :

“ $\Rightarrow$ ” Έστω  $\chi : V(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$  ένας  $k$ -χρωματισμός του  $G$ .

- Έστω  $\chi^{-1}(1), \chi^{-1}(2), \dots, \chi^{-1}(k)$  οι χρωματικές κλάσεις του  $G$ .
- Κορυφές που ανήκουν στην ίδια χρωματική κλάση δεν ενώνονται με ακμή.
- Το  $G$  είναι παραγόμενο υπογράφημα του  $K_{p_1, p_2, \dots, p_k}$  όπου  $p_i = |\chi^{-1}(i)|, 1 \leq i \leq k$ .
- Άρα το  $G$  είναι  $k$ -μερές. ✓

“ $\Leftarrow$ ” Έστω ότι το  $G$  είναι  $k$ -μερές και έστω  $V_1, V_2, \dots, V_k$  τα  $k$  μέρη του.

- Ο χρωματισμός  $\chi : \chi(v) = i \Leftrightarrow v \in V_i$  είναι ένας  $k$ -χρωματισμός του  $G$ .
- Άρα το  $G$  είναι  $k$ -χρωματίσιμο. ✓ ■

#### Λήμμα 8.4:

Έστω γράφημα  $G$ . Ισχύει ότι  $\chi(G) \geq \frac{n^2}{n^2-2m}$ , όπου  $n = |V(G)|$  και  $m = |E(G)|$ .

#### Απόδειξη :

- Έστω  $\chi(G) = k$ .
- Το  $G$  είναι  $k$ -μερές. [Λήμμα 8.3.]
- Το  $G$  είναι παραγόμενο υπογράφημα του  $K_{p_1, p_2, \dots, p_k}$ .

$$\begin{aligned} m &\leq |E(K_{p_1, p_2, \dots, p_k})| \\ \stackrel{\text{Λήμμα 8.2}}{=} &\frac{1}{2} \left( n^2 - \sum_{i=1}^k p_i^2 \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left( n^2 - \frac{n^2}{k} \right) \quad [\text{γιατί } \sum_{i=1}^k p_i^2 \geq \frac{1}{k} \left( \sum_{i=1}^k p_i \right)^2 = \frac{n^2}{k}] \end{aligned}$$




- Άρα,  $m \leq \frac{1}{2} \left( n^2 - \frac{n^2}{k} \right)$   
 $\Rightarrow k \geq \frac{n^2}{n^2-2m}$   
 $\Rightarrow \chi(G) \geq \frac{n^2}{n^2-2m}$



## Κρίσιμο γράφημα:

Έστω γράφημα  $G$ . Το  $G$  ονομάζεται **κρίσιμο** αν για κάθε υπογράφημα  $H \subset G$  ισχύει ότι  $\chi(G) > \chi(H)$ .

**Παράδειγμα:** (Κρίσιμα γραφήματα.)



- Ένα κρίσιμο γράφημα είναι “ελαχιστοτικό γράφημα” ως προς τον χρωματικό αριθμό.

### Λήμμα 8.5:

Έστω κρίσιμο γράφημα  $G$ . Ισχύει ότι  $\chi(G) \leq \delta(G) + 1$ .

### Απόδειξη [Με άτοπο.]:

- Έστω  $\chi(G) > \delta(G) + 1$ . Έστω κορυφή  $u \in V(G)$  με  $d(u) = \delta(G)$ .  
 $\Rightarrow d(u) < \chi(G) - 1$
- Το  $G$  είναι κρίσιμο.  $\Rightarrow \chi(G - u) = \chi(G) - 1$
- Έστω χρωματισμός του  $G - u$  με  $\chi(G) - 1$  χρώματα.
- Υπάρχει χρώμα, έστω  $c$ , που δεν χρησιμοποιείται στους γείτονες της  $u$ .
- Μπορώ να χρωματίσω το  $u$  με το χρώμα  $c$  και άρα το  $G$  με  $\chi(G) - 1$  χρώματα. **Άτοπο. ■**



### Θεώρημα 8.6 :

Έστω γράφημα  $G$ . Τότε  $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ .

**Απόδειξη** [Με επαγωγή]:

- Θα δείξουμε ότι το  $G$  είναι  $(\Delta(G) + 1)$ -χρωματίσιμο.

**Βάση:** Κάθε γράφημα με  $\Delta(G) + 1$  κορυφές είναι  $(\Delta(G) + 1)$ -χρωματίσιμο. ✓

**Ε.Υ.** Κάθε γράφημα  $G$  με  $< n$  κορυφές είναι  $(\Delta(G) + 1)$ -χρωματίσιμο.

**Ε.Β.** Έστω γράφημα  $G$  με  $n$  κορυφές.

- Έστω αυθαίρετη κορυφή  $u$  και έστω το γράφημα  $G - u$ .
- Το  $G - u$  είναι  $(\Delta(G) + 1)$ -χρωματίσιμο.  
⇒ Υπάρχει χρώμα, έστω  $c$  που δεν χρησιμοποιούν οι γείτονες της  $u$ .
- Χρωματίζοντας την  $u$  με το χρώμα  $c$ , λαμβάνω ένα νόμιμο χρωματισμό για το γράφημα  $G$  με  $\Delta(G) + 1$  χρώματα. ✓ ■

### Θεώρημα 8.7 [Brooks, 1941]:

Έστω συνεκτικό γράφημα  $G$  που δεν είναι πλήρες ούτε είναι περιττού μήκους κύκλος. Τότε  $\chi(G) \leq \Delta(G)$ .

**Απόδειξη** [Με επαγωγή στο  $|V(G)|$ ]:

- Θα δείξουμε ότι το  $G$  είναι  $\Delta(G)$ -χρωματίσιμο.

**Βάση:** Ισχύει για γραφήματα με  $n = 1$ ,  $n = 2$ ,  $n = 3$  κορυφές. ✓

**Ε.Υ.** Έστω ότι όλα τα γραφήματα  $G$  με  $n - 1$  κορυφές είναι  $\Delta(G)$ -χρωματίσιμα.

**Ε.Β.** Θα δείξω ότι όλα τα γραφήματα με  $n$  κορυφές είναι  $\Delta(G)$ -χρωματίσιμα.

- Έστω γράφημα  $G$  με  $\Delta(G) = k$ .

**Περίπτωση 1:** Υπάρχει κορυφή  $v \in V(G)$  με βαθμό  $d(v) < k$ .


- Θεωρώ το  $G - v$  και το χρωματίζω αναδρομικά.
- Υπάρχει χρώμα  $\lambda$  που δεν χρησιμοποιούν οι  $< k$  γείτονες της  $v$ .
- Χρωματίζω την  $v$  με το χρώμα  $\lambda$ . ✓

**Περίπτωση 2:** Όλες οι κορυφές του  $G$  έχουν βαθμό  $k$ . [Το  $G$  είναι  $k$ -κανονικό γράφημα.]

- Έστω το  $G - \{v\}$   $\rightarrow |V(G - \{v\})| = n - 1$ ,  $\Delta(G - \{v\}) = \Delta(G) = k$   
 $\rightarrow$  Το  $G - \{v\}$  είναι  $k$ -χρωματίσιμο
- Θα δείξουμε πώς να χρωματίσουμε το  $G$  με  $k$  χρώματα.

**Περίπτωση 2a:** Υπάρχουν δύο γειτονικές κορυφές της  $v$  που έχουν το ίδιο χρώμα.


- Κάποιο χρώμα, έστω  $\lambda$ , δεν χρησιμοποιείται στον χρωματισμό των γειτόνων της  $v$  (στο χρωματισμό του  $G - \{v\}$ ).
- Χρωμάτισε την  $v$  με  $\lambda$ . ✓



**Περίπτωση 2b:** Όλοι οι γείτονες της  $v$  έχουν διαφορετικό χρώμα.

- Έστω  $\chi(v_i) = i$ .
- $G_{ij}$ : Το γράφημα που επάγεται από τις κορυφές με χρώμα  $i$  και χρώμα  $j$ .

**Περίπτωση 2b1:** Οι κορυφές  $v_i$  και  $v_j$  ανήκουν σε διαφορετικές συνεκτικές συνιστώσες, έστω  $C_i, C_j$  του  $G_{ij}$ .




- Άλλαξε τα χρώματα ( $i \leftrightarrow j$ ) στην  $C_i$ . Το γράφημα παραμένει νόμιμα χρωματισμένο.
- Χρωμάτισε την  $v$  με χρώμα  $i$ . ✓

**Περίπτωση 2b2:** Οι κορυφές  $v_i$  και  $v_j$  ανήκουν στην ίδια συνεκτική συνιστώσα, έστω  $C_{ij}$ , για κάθε ζεύγος  $i, j$  του  $G_{ij}$ .

- $\forall v_i, v_j$  υπάρχει  $(v_i, v_j)$  μονοπάτι στην  $C_{ij}$ .


**Περίπτωση 2b2a:**  $d(v_i) \geq 2$  στην  $C_{ij}$ .



- Έστω  $x, y \in N_{C_{ij}}(v_i)$  με τουλάχιστον μια από τις  $x, y$  διαφορετική από την  $v_j$ .
- $\chi(x) = \chi(y) = j$
- $d_{C_{ij}}(v_i) \leq \Delta(G) - 1$ . [Λείπει η ακμή  $(v, v_i)$ .]
- Υπάρχει κάποιο χρώμα, έστω  $\lambda$ , διαφορετικό από το  $i$ , το οποίο δεν χρησιμοποιείται από κανένα γείτονα του  $v_i$  στο  $G$ .
- Φτιάξε νέο χρωματισμό του  $G$  όπου:
  - $\chi(v_i) = \lambda$
  - $\chi(v) = i$  ✓

**Περίπτωση 2b2b:**  $d(v_i) = 1$  στην  $C_{ij}$ . [Όμοια,  $d(v_j) = 1$  στην  $C_{ij}$ .]

**Περίπτωση 2b2b1:** Υπάρχει  $w \in C_{ij}$  (διαφορετικό από τα  $v_i, v_j$ , στο μονοπάτι από το  $v_i$  στο  $v_j$ ):  $d_{C_{ij}}(w) \geq 3$ .



- Έστω το πιο κοντινό στο  $v_i$  τέτοιο  $w$ .
- Έστω  $\chi(w) = j$ . Τότε όλοι οι γείτονες του  $w$  έχουν χρώμα  $i$ .
- Επειδή έχω 3 γείτονες του  $w$  με χρώμα  $i$  περισσεύουν 2 χρώματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τους γείτονες του  $w$ , ένα εκ των οποίων είναι διαφορετικό του  $j$ . Έστω  $\lambda$  το χρώμα αυτό.
- Χρωματίζω το  $w$  με το χρώμα  $\lambda$ .
- Τότε τα  $v_i$  και  $v_j$  βρίσκονται σε διαφορετικές συνεκτικές συνιστώσες του  $G_{ij}$ .  
 $\Rightarrow$  Το γράφημα  $G$  μπορεί να χρωματιστεί με  $\Delta(G)$  χρώματα [περίπτωση 2b1]. ✓


**Περίπτωση 2b2b2:**  $d_{C_{ij}}(w) = 2, \forall w \in C_{ij}. [w \notin \{v_i, v_j\}]$

- Στην περίπτωση αυτή η συνιστώσα  $C_{ij}$  στην οποία ανήκουν οι  $v_i, v_j$ , για κάθε ζεύγος  $i, j, i \neq j$  είναι ένα μονοπάτι με τα  $v_i$  και  $v_j$  στα άκρα του.

- Έστω οι συνιστώσες  $C_{ij}$ ,  $C_{j\ell}$  των  $G_{ij}$ ,  $G_{j\ell}$ .


**Περίπτωση 2b2b2a:** Τα μονοπάτια  $C_{ij}$  και  $C_{j\ell}$  έχουν κοινή κορυφή διαφορετική από την  $v_j$ .

- Έστω  $x$  μια κοινή κορυφή των δυο μονοπατιών (διαφορετική από την  $v_j$ ).



- $\chi(x) = j$
- Η  $x$  έχει 2 γείτονες με χρώμα  $i$  και 2 γείτονες με χρώμα  $\ell$ .
- Οι γείτονες της  $x$  δεν χρησιμοποιούν 2 χρώματα εκ των οποίων ένα είναι διαφορετικό του  $j$ . Έστω  $\lambda$  το αχρησιμοποίητο χρώμα.
- Χρωματίζουμε την  $x$  με το χρώμα  $\lambda$ .
- Τότε, οι  $v_i$  και  $v_j$  βρίσκονται σε διαφορετικές συνιστώσες του  $G_{ij}$ .  
 $\Rightarrow$  Υπάρχει χρωματισμός του  $G$  με  $\Delta(G)$  χρώματα [περίπτωση 2b1]. ✓

**Περίπτωση 2b2b2b:** Τα μονοπάτια  $C_{ij}$ ,  $C_{j\ell}$  έχουν μόνη κοινή κορυφή την  $v_j$ .



- Έστω  $w$  η γειτονική της  $v_j$  κορυφή στο μονοπάτι  $C_{ij}(v_j \rightarrow v_i)$ .
- Στο μονοπάτι  $C_{j\ell}(v_j \rightarrow v_\ell)$  ανταλλάσσω τα χρώματα  $j$  με  $l$ .
- Στον νέο χρωματισμό, έστω  $h$  θεωρώ την συνιστώσα  $C_{v_i v_j}^h$  που ενώνει τις κορυφές  $v_i$  με  $v_j$ .
- Η  $C_{v_i v_j}^h$  περιλαμβάνει κόμβους με χρώματα  $l$  και  $i$ . Λόγω του ότι ο βαθμός του  $v_j$  στην  $C_{v_i v_j}^h$  είναι ίσος με 1, και η  $w$  είναι γειτονική στην  $v_j$  και το χρώμα της  $w$  είναι  $i$ , η  $w$  ανήκει στο μονοπάτι  $C_{v_i v_j}^h(v_j \rightarrow v_i)$ .
- Η  $C_{v_i v_\ell}^h$  περιλαμβάνει κόμβους με χρώματα  $i$  και  $j$ . Λόγω του ότι ο βαθμός της  $v_i$  στο  $C_{v_i v_\ell}^h$  είναι ίσος με 1, και οι βαθμοί όλων των κορυφών του μονοπατιού είναι ίσοι με 2, και ότι το παλιό μονοπάτι από την  $v_i$  προς την  $w$  εξακολουθεί να είναι στο  $G_{ij}$ , η  $w$  ανήκει στην  $C_{v_i v_\ell}^h$ .

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να βρούμε χρωματισμό του  $G$  [περίπτωση 2b2b2a]. ✓

**Περίπτωση 2b2b3:** Δεν υπάρχει  $w \in C_{ij}$  στο μονοπάτι από το  $v_i$  στο  $v_j$ , δηλαδή, η  $C_{ij}$  αποτελείται από την ακμή  $(v_i, v_j)$ .

- Επειδή αυτό συμβαίνει για όλα τα ζεύγη  $v_i, v_j$ , οι  $k$  γείτονες του  $v$  σχηματίζουν ένα πλήρες γράφημα.  
⇒ Η  $v$  με τους γείτονες της σχηματίζει ένα πλήρες γράφημα.
- Αυτό συμβαίνει για κάθε  $v \in V$ . Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να βρούμε μία κορυφή  $v$  η αφαίρεση της οποίας από το  $G$  δεν θα οδηγούσε στην παρούσα περίπτωση.  
⇒ Το  $G$  είναι πλήρες γράφημα. [Γιατί;]  
⇒ Αυτό αντιβαίνει την υπόθεση του θεωρήματος, συνεπώς, η παρούσα περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί. ✓

